

## **La quimioteràpia contribueix a una quarta part de les morts per càncer: estudi**

**ABC NEWS, 13 de novembre de 2008**

Un nou estudi ha plantejat serioses preguntes sobre l'ús de la quimioteràpia per als pacients amb càncer en fase avançada.

La revisió de 600 pacients amb càncer a Gran Bretanya que van morir en els 30 dies posteriors al tractament ha trobat que una de cada quatre de les morts va ser causada o accelerada per la quimioteràpia.

La quimioteràpia és un tractament estàndard per al càncer, però l'estudi qüestiona si els pacients greus poden fer-hi front.

L'estudi el va fer la *National Confidential Inquiry in Patient Outcome and Deaths*. Els membres de l'enquesta provenen principalment dels col·legis reials mèdics Britànics.

La majoria d'aquests pacients examinats a l'estudi tenien quimioteràpia com a tractament pal·liatiu per alleujar els símptomes del càncer – ja s'havia descartat una cura.

L'informe va trobar que el 40 per cent d'ells van patir una intoxicació important com a resultat del tractament.

“Crec que sempre cal ser prudent i és molt important que els pacients estiguin plenament informats dels riscos i dels possibles beneficis del tractament”, va dir na Dra. Morse. “Però al final del dia serà la decisió del pacient sobre si accepta la quimioteràpia o no”.

L'estudi va preguntar si els pacients rebien informació suficient sobre el tractament. La doctora Diane Morse diu que en un de cada cinc casos la decisió de seguir endavant amb la quimioteràpia va ser inadequada.

“Allà on es va considerar inadequat, es va considerar que el pacient hauria tingut una millor qualitat de vida si no s'hagués donat el tractament”, va dir. “Eren pacients que estaven molt a prop del final de la vida i potser la quimioteràpia no els beneficiava”.

El professor Jim Bishop, director executiu de l'Institut del *Cancer Institute of New South Wales*, diu que Austràlia té taxes de supervivència del càncer molt millors que el Regne Unit. Però diu que l'estudi també planteja preguntes importants per als metges d'aquí. “El que es redueix no és tant la prudència, sinó el que diuen les proves”, va dir el professor Bishop. Hi ha una bona evidència que la intervenció en aquesta etapa millorarà les coses, podem millorar els símptomes o, de fet, no hi ha evidència que això millori el benestar dels pacients? “En aquest cas, això s'ha de discutir completament amb el pacient i el pacient participar en aquesta elecció”.

El Professor Ian Olver, *CEO* del Cancer Council, diu que si bé la quimioteràpia és de vegades la millor manera d'alleujar els símptomes del càncer, és possible que alguns pacients no entenguin completament els límits. "Crec que s'ha de tenir molta cura que el benefici no sigui exagerat o que el pacient no cregui que farà més del que pot", va dir.

Basat en un AM report per Sara Everingham

**Font:** [www.LearningGNM.com](http://www.LearningGNM.com)