




CHEMOTHERAPIE?



VOOR EN TIJDENS DE CHEMO-BEHANDELING

“Chemotherapie te verkopen als een ‘therapie’ is met alle waarschijnlijkheid het grootste bedrog in de geschiedenis van de geneeskunde. Degene die deze chemo-tortuur heeft bedacht verdient een standbeeld in de hel.”

Dr. Ryke Geerd Hamer



“Als chemicus, opgeleid om gegevens te interpreteren, vind ik het onbegrijpelijk dat artsen het overduidelijke bewijs, dat chemotherapie veel meer kwaad doet dan goed, negeren.”
– Voormalig voorzitter van The American Chemical Society

“Establishment medicine, with little or no evidence to support their barbaric use of these highly toxic drugs, continues to make fortunes while their patients spend their last days vomiting, debilitated, baldheaded and without dignity.”

Robert E. Willner M.D., Ph.D.



“De gevestigde geneeskunde, die nauwelijks of geen bewijs heeft voor het barbaarse gebruik van deze zeer giftige medicijnen, blijft doorgaan met het verdienen van fortuinen, terwijl hun patiënten de laatste dagen al overgevend doorbrengen, kaal, verzwakt en zonder waardigheid.” Robert E. Willner M.D., Ph.D.



Meer dan 1300 Borstkanker en longkankerpatiënten stierven in 2014 door chemotherapie, aldus dit onderzoek. Crédit : Alamy

“Patiënten moeten worden gewaarschuwd voor de gevaren van chemotherapie, nadat uit onderzoek is gebleken dat in sommige ziekenhuizen tot 50 procent van de patiënten overlijdt door kankermedicijnen. Voor het eerst keken onderzoekers naar het aantal kankerpatiënten dat stierf binnen 30 dagen na de start van chemotherapiebehandeling, wat aangeeft dat **de medicatie de doodsoorzaak is, in plaats van de kanker.**”

The Telegraph, 30 augustus 2016



“Heb je ooit een chemotherapie-kamer in een ziekenhuis gezien? Ik hoop van niet. Het is de dodencel. Wanneer ik haar mouw opstroopte zag ik een arm, de arm van een heroïneverslaafde ziet er nog aantrekkelijker uit. Er zijn zoveel bijwerkingen. Wat je ziet is een situatie waarin de vrouw eerst wordt gemarteld, waarna ze sterft. En waarom? Omdat dit wettelijk verplicht is. Als artsen zich niet aan de standaardprocedure houden verliezen ze hun levensonderhoud en reputatie, wat ze zal ruïneren. Ze zijn verplicht om een mislukt experiment keer op keer te herhalen. Josephine onderging chemotherapie en een gigantische operatie en elke procedure die je vervolgens maar kunt bedenken. Elke ‘oscopie’ die er was. Het was grotesk. Middeleeuws” (Lord Saatchi na de dood van zijn vrouw, romanschrijver Josephine Hart). – *The Telegraph*, 28 april 2013



De bijdrage van cytotoxische chemotherapie tot 5 jarige overleving bij volwassen maligniteiten

De auteurs van deze studie ontdekten dat de bijdrage van chemotherapie aan de 5-jaarsoverleving bij volwassenen in Australië 2,3 procent was en in de VS 2,1 procent. Zij benadrukken dat deze cijfers, om redenen die in detail in de studie zijn uiteengezet, “als de bovengrens van de effectiviteit moeten worden beschouwd” (*Clinical Oncology*, 2004).

Table 1 – Impact of cytotoxic chemotherapy on 5-year survival in Australian adults

Malignancy	ICD-9	Number of cancers in people aged >20 years*	Absolute number of 5-year survivors due to chemotherapy†	Percentage 5-year survivors due to chemotherapy‡
Head and neck	140–149, 160, 161	2486	63	2.5
Oesophagus	150	1003	54	4.8
Stomach	151	1904	13	0.7
Colon	153	7243	128	1.8
Rectum	154	4036	218	5.4
Pancreas	157	1728	–	–
Lung	162	7792	118	1.5
Soft tissue sarcoma	171	665	–	–
Melanoma of skin	172	7811	–	–
Breast	174	10 661	164	1.5
Uterus	179 + 182	1399	–	–
Cervix	180	867	104	12
Ovary	183	1207	105	8.7
Prostate	185	9869	–	–
Testis	186	529	221	41.8
Bladder	188	2802	–	–
Kidney	189	2176	–	–
Brain	191	1116	55	4.9
Unknown primary site	195–199	3161	–	–
Non-Hodgkin's lymphoma	200 + 202	3145	331	10.5
Hodgkin's disease	201	341	122	35.8
Multiple myeloma	203	1023	–	–
Total		72 903‡	1690	2.3%

*Numbers from Ref. [21].

†Absolute numbers (see text).

‡% for individual malignancy.

§Total for Australia 1998 = 80 864 people.

Tabel 1 – Impact van cytotoxische chemotherapie op de 5-jaarsoverleving bij volwassenen uit Australië**Table 2 – Impact of cytotoxic chemotherapy on 5-year survival in American adults**

Malignancy	ICD-9	Number of cancers in people aged >20 years*	Absolute number of 5-year survivors due to chemotherapy†	Percentage 5-year survivors due to chemotherapy‡
Head and neck	140–149, 160, 161	5139	97	1.9
Oesophagus	150	1521	82	4.9
Stomach	151	3001	20	0.7
Colon	153	13 936	146	1.0
Rectum	154	5533	189	3.4
Pancreas	157	3567	–	–
Lung	162	20 741	410	2.0
Soft tissue sarcoma	171	858	–	–
Melanoma	172	8646	–	–
Breast	174	31 133	446	1.4
Uterus	179–182	4611	–	–
Cervix	180	1825	219	12
Ovary	183	3032	269	8.9
Prostate	185	23 242	–	–
Testis	186	989	373	37.7
Bladder	188	6667	–	–
Kidney	189	3722	–	–
Brain	191	1824	68	3.7
Unknown primary site	195–199	6200	–	–
Non-Hodgkin's lymphoma	200 + 202	6217	653	10.5
Hodgkin's disease	201	846	341	40.3
Multiple myeloma	203	1721	–	–
Total		154 971	3306	2.1%

*Numbers from Ref. [22].

†Absolute numbers (see text).

‡% for individual malignancy.

Tabel 2 – Impact van cytotoxische chemotherapie op de 5-jaarsoverleving bij volwassenen uit Amerika



“Geen enkele chemotherapie heeft ooit de onderliggende oorzaken van kanker genezen of opgelost. Wat de reguliere geneeskunde als ‘succesvolle’ chemotherapiebehandelingen beschouwt, bestaat slechts uit beheersen van symptomen, meestal ten koste van het verstoren van andere vitale fysiologische functies bij patiënten, die later bijwerkingen zullen veroorzaken. Er bestaat niet zoiets als een medicijn zonder bijwerking” (*Waking Times*, 18 januari 2013).



Studie onthult: Chemotherapie heeft de dood van velen versneld of veroorzaakt

By Reuben Chow, *Natural News*, 2 februari 2009



Volgens artsen beginnen veel patiënten met chemotherapie zonder volledig geïnformeerd te zijn over de procedure. (ABC)


Chemotherapie draagt bij aan een kwart van de kankersterfgevallen

ABC News, november 2008



De chemische oorlog tegen kanker voert terug naar de Eerste Wereldoorlog

Christian Bachmann: *Die Krebsmafia*, 1986



Hoe wetenschappelijk zijn orthodoxe kankerbehandelingen?

Walter Last © 2004

Nexus Magazine, Deel 11, Nummer 4 (Juni-Juli 2004)



Chemotherapie – Behandeling zonder effect

German News Magazine *Der Spiegel*, 04.10.2004

“Mocht ik ooit kanker krijgen, dan zou ik mezelf nooit laten behandelen in een conventionele kankerkliniek. Alleen kankerpatiënten die wegblijven van dergelijke centra hebben een overlevingskans.” – Prof. Dr. Georges Mathé, Oncologist

Van 1962-1965 was Dr. Georges Mathé, M.D. de voorzitter van de *European Organization for Research and Treatment of Cancer* [Europese Organisatie voor Onderzoek en Behandeling van Kanker] (EORTC). In 1985 werd Prof. Mathé met hulp van Dr. Hamer genezen van zijn bronchiaal carcinoom. Ondanks dat hij de voordelen van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde uit eerste hand had ervaren, bleef Prof. Mathé zijn kankerpatiënten – duizenden – behandelen met chemotherapie.

“De meerderheid van de kankerpatiënten in dit land sterft als gevolg van chemotherapie, die borst-, dikke darm- of longkanker niet geneest. Dit is al meer dan tien jaar gedocumenteerd. Desondanks gebruiken artsen nog steeds chemotherapie om deze tumoren te bestrijden” (Allen Levin, MD, UCSF, *The Healing of Cancer*, Marcus Books, 1990).

**De overgrote meerderheid van oncologen zou
Chemotherapie NIET gebruiken als ze kanker krijgen**

75% van de Amerikanen, bij wie kanker is vastgesteld, wordt door hun oncologen chemotherapie voorgeschreven.

75% van de oncologen zei ook dat als ze kanker zouden hebben, **ze zelf GEEN chemotherapie zouden gebruiken.**

(Uit: McGill Cancer Center survey (1986), in: John Robbins, *Reclaiming Our Health*, 1998)

Bron: www.LearningGNM.com