

Alerta de quimioteràpia: centenars de persones moren per medicaments contra el càncer

Article publicat a: *The Telegraph*, 30 d'agost de 2016
per Sarah Knapton, Editora Científica




Els pacients han de ser advertits sobre els perills de la quimioteràpia després que les investigacions han demostrat que els medicaments contra el càncer estan matant fins al 50% dels pacients en alguns hospitals.

Per primera vegada, els investigadors van analitzar el nombre de pacients amb càncer que van morir en els 30 dies posteriors a l'inici de la quimioteràpia, cosa que indica que el medicament és la causa de la mort, més que el càncer.

L'estudi del Public Health England & Cancer Research UK va trobar que a Anglaterra al voltant del 8,4% dels pacients amb càncer de pulmó i el 2,4% dels pacients amb càncer de mama van morir en un mes.

Però en alguns hospitals la xifra era molt més alta. A Milton Keynes, la taxa de mortalitat pel tractament del càncer de pulmó va ser del 50,9%, tot i que es va basar en un nombre molt reduït de pacients.



A Lancashire Teaching Hospitals, la taxa de mortalitat als 30 dies va ser del 28% per a la quimioteràpia pal·liativa per al càncer de pulmó, que s'administra quan no s'espera una cura i es dona tractament per alleujar els símptomes.

Segons la investigació, les morts de pacients amb càncer de pulmó per quimioteràpia també van ser molt superiors a la mitjana nacional a Blackpool, Coventry, Derby, South Tyneside i Surrey i Sussex.

De la mateixa manera, al voltant d'una de cada cinc persones que van rebre cures pal·liatives per càncer de mama als hospitals de la Universitat de Cambridge van morir a causa del seu tractament.

El Public Health England (PHE), va dir que s'havia posat en contacte amb els hospitals interessats per demanar-los que revisin les pràctiques.

En doctor Jem Rashbass, responsable del càncer al PHE, va dir: "La quimioteràpia és una part vital del tractament del càncer i és una gran raó de la millora de les taxes de supervivència durant les últimes quatre dècades".

"No obstant això, és un medicament potent amb efectes secundaris significatius i sovint pot ser difícil aconseguir l'equilibri adequat sobre quins pacients tractar de manera agressiva.

"Aquells hospitals les taxes de mortalitat dels quals estan fora del rang esperat han tingut les troballes compartides amb ells i els hem demanat que revisin la seva pràctica i les seves dades".

L'estudi va analitzar més de 23.000 dones amb càncer de mama i gairebé 10.000 homes amb 9634 non-small cell lung cancer que es van sotmetre a quimioteràpia el 2014. De les que van rebre tractament, 1.383 van morir en 30 dies.



La quimioteràpia és tòxica per a l'organisme perquè no discrimina entre cèl·lules sanes i canceroses.

Els investigadors també van trobar que hi havia diferències significatives en la supervivència de les persones grans i les que tenien una salut més pobre. Van aconsellar als metges que tinguessin més cura a l'hora de seleccionar pacients per al tractament on podria fer més mal que bé.

"Les estadístiques no suggereixen una mala pràctica en general, però hi ha alguns casos atípics", va dir el professor David Dodwell, de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital St James, Leeds, Regne Unit.

"Podrien ser problemes de dades i xifres esbiaixades a causa de només unes poques morts, però, tanmateix, també podria ser degut a problemes amb la pràctica clínica.

“Crec que és important conscienciar els pacients que la quimioteràpia té desavantatges potencialment mortals. I els metges haurien de tenir més cura amb qui tracten amb quimioteràpia”.


El Professor David Cameron, del Centre de Càncer d'Edimburg, Western General Hospital, Edimburg, Escòcia, va afegir: “a preocupació és que alguns dels pacients que moren als 30 dies després de rebre la quimioteràpia probablement no haurien d’haver rebut la quimioteràpia. Però, quants? No hi ha una manera fàcil de respondre-ho, però potser mirar aquells llocs/hospitals on la taxa de mortalitat era més alta podria ajudar”.

“A més, si donem menys quimioteràpia, alguns pacients moriran perquè no van rebre quimioteràpia. És un bon equilibri i com més dades tinguem, millor podrem assegurar-nos d’obtenir l’equilibri correcte”.

El Professor Peter Johnson, metge en cap de Cancer Research UK, va dir: “La quimioteràpia és una part important del tractament per a moltes persones amb càncer. Tenir informació sobre com s’està lliurant és de vital importància per als pacients i per al servei de salut”.

Tots els hospitals nomenats van dir que havien revisat els casos des de llavors i estaven satisfets que la prescripció de quimioteràpia era segura.

La investigació es va publicar a *The Lancet Oncology*.



Font: <https://www.telegraph.co.uk/science/2016/08/30/chemotherapy-warning-as-hundreds-die-from-cancer-fighting-drugs/>

Font: www.LearningGNM.com