


БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА**ДАТА:** ноябрь 2016 г.**КЛИЕНТ:** Правша, 10 лет.

Субъективная жалоба: мать мальчика заявила, что у ее сына диагностировали бронхиальную астму и аллергию на растения и деревья в возрасте 7 лет, и что за последний год ситуация ухудшилась.

У клиента были симптомы затрудненного дыхания (хрипы) и сухого кашля, усиливающегося ночью. За последние три года было как минимум десять визитов к врачу, два посещения отделения неотложной помощи и одна госпитализация. Ему прописали два типа ингаляторов, и он использовал их время от времени, когда у него были трудности с дыханием. Его мама сказала, что не было никакого облегчения ни от лекарств, ни от какого-либо другого лечения; поэтому она почти отчаялась.

Ее направили в офис для консультации по GNM с надеждой дать ей ещё один шанс найти ответы на свои вопросы, чтобы помочь своему сыну.

Наблюдение: у клиента было немного затрудненное дыхание с периодическим сухим кашлем.

Затронутые органы: бронхиальные мышцы

Эмбриональный зародышевый слой: новая мезодерма

Центр управления в мозге: Паренхима мозга; Моторная кора

Объяснение GNM: биологический конфликт, связанный с мускулатурой бронхов – конфликт территориальной угрозы у мужчин (или женский конфликт страха-испуга), в зависимости от пола, латеральности и гормонального статуса человека (см. констелляция бронхиальной астмы). Отличительный аспект конфликта, связанного с мышечной тканью - это дополнительный стресс от «невозможности убежать», «неспособности действовать», чувствовать себя «привязанным к земле», окаменевшим, застрявшим. Во время **конфликт-активной фазы** происходит потеря клеток бронхиальной мышечной ткани (контролируемой паренхимой головного мозга) пропорционально степени активности конфликта и происходит усиливающийся паралич бронхиальных мышц (контролируемых моторной корой). Паралич вызывает затрудненное дыхание, явно затрудненный вдох – и длительный выдох из-за сниженной функции бронхиальных мышц, контролирующих дыхание.

Во время **фазы исцеления** бронхиальные мышцы восстанавливаются. Паралич продолжается вплоть до окончания PCL-A фазы. Эпилептоидный криз проявляется как приступ кашля с бронхиальными спазмами и судорогами. Кашель сухой. Клиент в настоящее время находится в состоянии "**зависшего исцеления**". Треки должны быть выявлены, чтобы завершить исцеление.

Понимание GNM: клиент понял объяснение GNM и сразу осознал, что его астма обострилась после инцидента произошедшего более года назад в Мекке (Саудовская Аравия). Его отец поехал в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж в священном городе Мекка. Мальчик вспомнил, что он смотрел новости по телевизору, когда услышал, что в Мекке рухнул

подъемный кран, убив и ранив тысячи человек (**его DHS**). Он сказал, что испугался и что они с мамой стали звонить отцу, чтобы подтвердить, что он в порядке. Они не могли связаться с отцом вплоть до следующего дня, когда они наконец получили известие, что он не пострадал.

Мальчик осознал, что его астма была связана со страхом, возникшим когда он увидел новости об аварии в Мекке - из-за беспокойства за своего отца. Понимание того, что его отец теперь в безопасности дома позволило ему завершить исцеление.

Благодаря новому взгляду также были убраны треки, связанные с исходным конфликтом.

Результаты: мать сообщила, что дыхание ее сына улучшилось по дороге домой и что он мирно заснул в машине. Она сказала: «Я была так счастлива, что он наконец может спокойно спать». Через неделю во время последующего звонка она сказала, что у него все хорошо. Проверка через год и через 2 года подтвердила, что он чувствует себя хорошо.

*Для разъяснения конкретных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу
«Пять Биологических Законов»*

Источник: www.LearningGNM.com