



BİR ÇOCUĞUN BURUN KANAMASI

anonim

30 Aralık 2009

“Onun için dehşet verici bir şok olmalıydı...”

4 yaşındaki oğlumuzun özellikle geceleri sık sık şiddetli burun kanaması olurdu. Hiçbir sebep bulunamadığından, merkezi ısıtma sisteminin yarattığı kuru havayı suçladık.

Birkaç yıldır German New Medicine'dan haberi olan kocam bunun bir tür “burun çatışması” [burun çatışması, gerçek anlamda ya da mecazi olarak yaşanan bir “**koku çatışmasıdır**”. Burun kanaması iyileşme fazında, tipik olarak Epileptoid Kriz sırasında meydana gelir] olması gerektiğini söyledi. Bu çatışmayı neyin harekete geçirmiş olabileceği üzerine kafa yorduk.

Beklenmedik şekilde ansızın bunun İtalya'daki bir tatilde olmuş olabileceği düşüncesi geldi aklıma!

Oğlumuz her zaman kuru yemiş sevmiştir. Henüz pek dişi olmadığı zaman bile onları mer ve çiğnerdi. Ekim ayında bir gün 15 aylıkken, bir süredir ağzında küçük bir ceviz parçasını çiğniyordu. Bir kutunun üzerine doğru sendeledi ve olayla orantısız şekilde çığlıklar atmaya başladı. Anlaşıldı ki cevizi yutmuş ama sonrasında nefes alamamıştı.

Kocam ambulansı çağırdı ve biz de aynı zamanda boğazında ya da her neredeyse onu çıkarmak için elimizden geleni yaptık çünkü neredeyse mosmor olmaya başlamıştı. Ambulans geldiğinde çok şükür daha rahat nefes alabiliyordu ancak daha önce olmayan hafif bir ısıklık sesi vardı. Bu nedenle acil servisi doktoru hastanede buna bakılmasını istedi.

Geçmişe baktığımızda, aldığımız tedavi berbat olduğundan bunun büyük bir hata olduğunu düşünürüz. Oğlumuz muayene edilmeden önce bile ortalığa yayılan korku haricinde başka bir şey yoktu. Bu yüzden, tuhaf ısıklık sesi hala var olmasına rağmen kendi kararımızla hastaneyi terk ettik. Sonrasında onu emzirirken hala bu sesi duyduğum için, burnunda bir şeyin takılı kalmış olduğunu düşünmeye başladım.

Tam 14 gün sonra haftanın aynı günü ve neredeyse aynı dakikalarda altını değiştirirken öğürmeye başladı ve hafifçe genişlemiş ve iğrenç görüntülü bir ceviz parçasını tükürdü. Altına bezini koymak için küçük poposunu kaldırdığımda muhtemelen burnunda tıkalı kalmış olan ceviz gevşemiş ve boğazına inerek onu tükürmesine imkan vermişti. Böylece ısıklık sesi de bununla gitti! Hemen ardından düzensiz burun kanamaları yeniden başladı ve neredeyse 3 yıl devam etti. Tuhaf şekilde kış aylarında daha kötü oluyordu. Bir keresinde bunun evde olduğumuzda olduğunu çünkü dışarılarda kolaylıkla bulunmadığı için bu sevdiği cevizi evde daha çok verdiğimiz fark ettik.

15 aylıkken burnunda 14 gün boyunca takılı kalmış olması onun için dehşet verici bir şok olmalıydı!

Eve gelir gelmez ona bütün bu ceviz hikayesini anlattık. Hemen kuruyemişleri rahatça yiyebileceği dişleri olduğunu ve burnunun da artık bir şey tıkanmayacak kadar büyük olduğunu söyleyerek, bunun tekrar başına gelmeyeceğinden memnun olduğunu söyledi. Tam ne kadar iyi anladığını düşündük ki, ansızın üst üste hapşırmaya başladı.

Altı hafta kadar oğlumuzun burun kanaması hiç olmadı. Sonra bir kez oldu ve biz de bütün hikayeyi bir kez daha anlattık. Sonrasındaki 2 ay boyunca hiç olmadı. Ancak birkaç gün önce yatma saati öncesi mutfakta oturuyorduk ve biraz ceviz istediğini söyledi. Ona cevizi verdim ve on dakika sonra burnundan yine bolca kan gelmeye başladı.

Bu bizim için onun günlük beslenmesinden cevizi çıkarmamız gerektiği anlamına geliyordu. Bu sorun değil çünkü diğer kuruyemişleri burnu kanamaksızın yiyebiliyor!

GNM Açıklaması: Eğer çatışma zamanında çözülemezse, o sıradaki tetikleyici yoldan kaçınmak iyi bir fikirdir. Oğlan ilerleyen yaşlarda bu çatışmanın doğal yollarla üstesinden gelecektir.

Orijinal Almanca belgenin İngilizce çevirisinden çevrilmiştir

Çeviren: Nermin Uyar

Kaynak: www.LearningGNM.com