



La quimioterapia contribuye a una cuarta parte de las muertes por cáncer: estudio

ABC BEWS, 13 de noviembre de 2008

Un nuevo estudio ha planteado serias dudas sobre el uso de la quimioterapia para pacientes con cáncer en etapa avanzada.

La revisión de 600 pacientes de cáncer en Gran Bretaña que murieron dentro de los 30 días posteriores al tratamiento encontró que una de cada cuatro de las muertes fue causada o acelerada por la quimioterapia.

La quimioterapia es un tratamiento estándar para el cáncer, pero el estudio cuestiona si los pacientes gravemente enfermos pueden hacerle frente.

El estudio fue realizado por la *National Confidential Inquiry in Patient Outcome and Deaths*. Los miembros de la investigación provienen principalmente de los colegios médicos reales británicos.

La mayoría de los pacientes analizados en el estudio recibieron quimioterapia como tratamiento paliativo para aliviar los síntomas del cáncer; ya se había descartado una cura.

El informe encontró que el 40 por ciento de ellos sufrieron una intoxicación significativa como resultado del tratamiento.

“Creo que siempre es necesario ser cauteloso y es muy importante que los pacientes estén completamente informados sobre los riesgos y los beneficios potenciales del tratamiento”, dijo el Dr. Morse. “Pero al final del día será la decisión del paciente si acepta o no la quimioterapia”.

El estudio preguntó si los pacientes recibieron suficiente información sobre el tratamiento. La Dra. Diane Morse dice que en uno de cada cinco casos la decisión de seguir adelante con la quimioterapia fue inapropiada.

“Donde se consideró inapropiado, se consideró que el paciente habría tenido una mejor calidad de vida si no se le hubiera dado el tratamiento”, dijo. “Eran pacientes que estaban muy cerca del final de la vida y quizás la quimioterapia no les benefició”.

El Profesor Jim Bishop, director ejecutivo del *Instituto del Cáncer de Nueva Gales del Sur*, dice que Australia tiene tasas de supervivencia al cáncer mucho mejores que el Reino Unido. Pero dice que el estudio también plantea preguntas importantes para los médicos. “A lo que se reduce no es tanto a la cautela sino a lo que dice la evidencia”, dijo el profesor Bishop. “¿Hay buena evidencia de que la intervención en esta etapa mejorará las cosas, podemos mejorar los síntomas o, de hecho, no hay evidencia de que esto mejore el bienestar de los pacientes? En cuyo caso, eso debe discutirse completamente con el paciente y el paciente debe participar en esa elección”.

El director ejecutivo del Cancer Council, el profesor Ian Olver, dice que, si bien la quimioterapia es a veces la mejor manera de aliviar los síntomas del cáncer, es posible que algunos pacientes no entiendan completamente sus límites. “Creo que hay que tener mucho cuidado de que no se exagere el beneficio o que el paciente no crea que va a hacer más de lo que puede”, dijo.

Basado en un informe de AM de Sara Everingham

Fuente: www.LearningGNM.com

© LearningGNM.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este documento no reemplaza el consejo médico profesional.