





PROGRAMMES BIOLOGIQUES SPÉCIAUX

TISSU ADIPEUX


Auteur : Caroline Markolin, Ph. D.



Rév. 1.00



DÉVELOPPEMENT ET FONCTION DU TISSU ADIPEUX : le tissu adipeux forme une épaisse couche sous la peau (la graisse sous-cutanée) et autour des organes internes (la graisse viscérale). Il a une fonction d'isolation et de soutien. Outre les cellules adipeuses, le tissu adipeux contient des composants du tissu conjonctif de soutien tels que les fibres élastiques. Le tissu adipeux provient du mésoderme nouveau et est donc contrôlé par la moelle cérébrale.



NIVEAU CÉRÉBRAL : le tissu adipeux du côté droit du corps est contrôlé par le côté gauche de la **moelle cérébrale** ; le tissu adipeux du côté gauche du corps est contrôlé par le côté droit de la moelle cérébrale. Il existe donc une corrélation croisée entre le cerveau et l'organe.

REMARQUE : les os, les muscles squelettiques, les vaisseaux et ganglions lymphatiques, les vaisseaux sanguins, le tissu conjonctif et le tissu adipeux partagent les mêmes relais cérébraux et, donc, le même conflit biologique ; à savoir, un conflit de dévalorisation de soi. Ces centres de contrôle sont positionnés de manière ordonnée de la tête aux pieds.


CONFLIT BIOLOGIQUE : le conflit biologique lié au tissu adipeux est un **léger conflit de dévalorisation de soi ou de perte d'estime de soi**. Les conflits de dévalorisation de soi spécifiques sont les mêmes que ceux qui concernent les os et les articulations.

Conformément à la logique de l'évolution, les **conflits de dévalorisation de soi** constituent le principal thème conflictuel associé aux **organes contrôlés par la moelle cérébrale** et dérivant du mésoderme nouveau.

REMARQUE : le fait que le conflit affecte le tissu adipeux du côté droit ou gauche du corps est déterminé par la latéralité de la personne ainsi que par le fait que le conflit soit lié à la mère/enfant ou au partenaire. Un conflit localisé affecte le tissu adipeux le plus proche de l'endroit du corps impliqué dans le conflit de dévalorisation de soi.

PHASE DE CONFLIT ACTIF : **nécrose du tissu adipeux (perte cellulaire)**.

PHASE DE GUÉRISON : durant la première partie de la phase de guérison (**PCL-A**), la perte de tissu est reconstituée par une **prolifération cellulaire** accompagnée d'un **gonflement** dû à l'œdème (accumulation de liquide) dans la zone en cours de guérison. En fonction de l'intensité et de la durée de la phase de conflit actif, la taille de la ou des masses varie.



Un gonflement localisé se présente sous la forme d'un **lipome** (du point de vue de l'apparence, un lipome ressemble à un neurofibrome).

Un lipome du côté gauche du cou correspond à un conflit de dévalorisation de soi au niveau intellectuel avec un partenaire, si la personne est gauchère (à distinguer du lymphome de Hodgkin et du lymphome non hodgkinien).



Les petits nodules adipeux sont appelés **xanthomes**. La zone affectée révèle la partie du corps qui a été impliquée dans le conflit de dévalorisation de soi.



La **cellulite**, également connue sous le nom d'adipose œdémateuse, se présente sous la forme de poches de graisse situées juste sous la peau, ce qui lui donne un aspect capitonné et grumeleux (différent de la peau lâche et ridée résultant du processus naturel de vieillissement).

La cellulite touche principalement les femmes, souvent jeunes, et surtout les « zones à problèmes » telles que les cuisses et les fesses considérées comme « trop grosses » (une préoccupation issue de notre culture ; dans la nature, il existe ni « trop gros » ni « trop mince »). L'aspect « disgracieux » génère généralement de nouveaux conflits de dévalorisation de soi, ce qui aggrave la situation.



Dans le cas de la **cellulite** (une autre affection portant le même nom que la cellulite (adipose œdémateuse) avec laquelle il ne faut pas confondre), la zone concernée est enflée et enflammée, en particulier lorsque les bactéries participent au processus de guérison.


Un conflit de dévalorisation de soi associé à la jambe pourrait être provoqué par le fait de ne pas réussir à suivre le rythme (au sens propre comme au sens figuré). Si l'affection concerne la jambe droite (voir l'image), cela indique qu'il s'agit d'un conflit mère/enfant, si la personne est gauchère.

REMARQUE : tous les **organes dérivant du mésoderme nouveau** (« groupe de luxe »), y compris le tissu adipeux, révèlent le **sens biologique du SBS à la fin de la phase de guérison**. Lorsque le processus de guérison est terminé, l'organe ou le tissu se retrouve plus fort qu'auparavant, ce qui lui permet d'être mieux préparé en cas de nouveau conflit du même type.


Source : www.learninggnm.com

© LearningGNM.com


AVERTISSEMENT : les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis médical professionnel.




RELATION MOELLE CÉRÉBRALE – ORGANES



© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer



Cortex cérébral	PERTE CELLULAIRE (ulcération, nécrose)	Restauration du tissu par les bactéries
Moelle cérébrale		
Cervelet	PROLIFÉRATION CELLULAIRE	Élimination des cellules par les champignons et les bactéries
Tronc cérébral		




DHS (Dirk Hamer Syndrome) – conflit biologique
CL (ConflictLyse) – résolution du conflit
PCL (Post-ConflictLyse) – phase de guérison



PROGRAMMES BIOLOGIQUES SPÉCIAUX

SCHÉMA DES DEUX PHASES




DHS (Dirk Hamer Syndrome) – conflit biologique


CL (ConflictLyse) – résolution du conflit

PCL (Post-ConflictLyse) – phase de guérison

© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer



RELATION MOELLE CÉRÉBRALE – ORGANES



© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer