





BIOLÓGIAI SPECIÁLIS PROGRAMOK

ZSÍRSZÖVET


Caroline Markolin Ph.D. írása



Átdolg. 1.00



A ZSÍRSZÖVET FEJLŐDÉSE ÉS FUNKCIÓJA: A zsírszövet egy vastag réteget képez a bőr alatt (szubkután zsír) és a belső szervek körül (zsigeri zsír). Szigetelő és támasztó funkciója is van. A zsírsejteken kívül a zsír laza kötőszöveti elemeket, mint például rugalmas rostokat is tartalmaz. A zsírszövet az új mezodermából ered, tehát a nagyagyvelőből történik az irányítása.



AGY SZINT: A nagyagyvelőben a test jobb oldali zsírszövetének irányítása az agy bal oldalából történik; míg a bal oldali zsírszövet irányítása a jobb agyféltekéből történik. Tehát az agy és a szerv között keresztezett kapcsolat van.

MEGJEGYZÉS: A csontoknak, a vázizmoknak, a nyirokereknek és nyirokcsomóknak, a vérereknek, a kötőszövetnek és zsírszövetnek ugyanaz az agyreléjük, és ebből kifolyólag ugyanaz a biológia konfliktusuk is, ami az önleértékelés konfliktus. Az irányítóközpontok rendezetten helyezkednek el a fejtől a lábujjig.

BIOLÓGIAI KONFLIKTUS: A zsírszövethez kapcsolódó biológiai konfliktus egy **enyhe önleértékelés konfliktus** vagy az **önbecsülés elvesztése**. A konkrét önleértékelés konfliktusok ugyanazok, mint a csontoknál és ízületeknél.


Az evolúciós érveléssel összhangban az **önleértékelés konfliktusok** azok az elsődleges konfliktus témák, amelyek az új mezodermából származó, **nagyagyvelő által irányított szervekhez** kapcsolódnak.

MEGJEGYZÉS: Az, hogy a konfliktus a test jobb vagy bal oldalán lévő zsírszövetet érinti, az ember kezűsége határozza meg, és az, hogy a konfliktus anya/gyerek vagy partnerrel kapcsolatos. Egy helyhez kötött konfliktus azt a kötőszövetet érinti, amely a legközelebb van az önleértékelés konfliktussal kapcsolatos területhez.

KONFLIKTUS-AKTÍV FÁZIS: zsírszövet

nekrózis (sejtveszteség)

GYÓGYULÁSI FÁZIS: A gyógyulási fázis első részében (**PCL-A**) a szövetveszteséget **sejtszaporulat** állítja helyre, **duzzadással** kísérve, amit a gyógyuló területen lévő ödéma (folyadék felhalmozódás) okoz. A konfliktus-aktív fázis erősségétől és hosszától függően a növekedés(ek) mérete változó.



Egy helyhez kötött duzzanat **lipómaként** jelentkezik (egy lipóma hasonlóan néz ki, mint egy neurofibróma).

A nyak bal oldalán lévő lipóma egy partnerrel kapcsolatos önleértékelés konfliktussal társul, ha az ember bal kezes (hasonlítsd össze a Hodgkin-limfómával és a nem-Hodgkin-limfómával).



Az apró zsírcsomóknak **xanthoma** a neve. Az érintett terület megmutatja, hogy a test melyik részével volt kapcsolatos az önleértékelés konfliktus.



A **narancsbőr**, vagy más néven adiposis edematosa, közvetlenül a bőr alatt zsírpárnákként mutatkozik meg, gödrös, egyenetlen felszínt adva a bőrnek (ez különbözik a laza ráncos bőrtől, ami a természetes öregedési folyamat eredménye).

A narancsbőr főleg a nőket érinti, gyakran fiatal korban, és túlnyomórészt a „problémás területeken”, mint a combokon és a fenéken, amit „túl kövérnek” tartanak (egy kulturálisan kialakult felfogás; a Természetben nincs „túl kövér” vagy „túl sovány”). A „nem vonzó” külső általában további önleértékelés konfliktusokat okoz, amely rontja az állapotot.



A **cellulitisz** esetében (nem összetévesztendő a narancsbőrrel), az érintett terület duzzadt és be van gyulladva, különösen, amikor baktériumok segítik a gyógyulási folyamatot.

A lábbal kapcsolatos önleértékelés konfliktust előidézhetsz az, hogy valaki nem képes lépést tartani (valós vagy átvitt értelemben). Ha a jobb lábon jelenik meg ez az állapot (lásd a képet), az egy anyával vagy gyerekkel kapcsolatos konfliktusra utal, ha az ember bal kezes.


MEGJEGYZÉS: Minden **szervben, amely az új mezodermából származik** („többszörös csoport”), beleértve a zsírszövetet, a **gyógyulási fázis végén** látható a **biológiai cél**. Miután a gyógyulási folyamat befejeződött, a szerv vagy szövet erősebb, mint korábban, ami lehetővé teszi, hogy jobban felkészültek legyünk egy hasonló jellegű konfliktusra.

Fordítás: Váradi Hajnalka


Forrás: www.learninggnm.com

© LearningGNM.com
FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁS: Ebben a dokumentumban található információ nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást.

reserprenonylma (alal) reserprenonylma (



Nagyagygykéreg	SEJTVESZTESÉG (ulceráció, nekrozis)	Szövet helyreállítása baktériumokkal
Nagyagygyvelő		
Kisagy	SEJTSZAPORULAT	Sejt eltávolítás gombákkal és baktériumokkal
Agytörzs		




DHS (Dirk Hamer Szindróma) – Biológiai konfliktus
CL (Conflictolysis) – Konfliktusmegoldás
PCL (Post-Conflictolysis) – Gyógyulási fázis

© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer




BIOLÓGIAI SPECIÁLIS PROGRAMOK KÉTFÁZISÚ RENDSZER




DHS (Dirk Hamer Szindróma) – Biológiai konfliktus
CL (Conflictolysis) – Konfliktusmegoldás
PCL (Post-Conflictolysis) – Gyógyulási fázis

© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer



NAGYAGYVELŐ – SZERV KAPCSOLAT



© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer