

nyálkahártya ulcerációja a konfliktus aktivitás mértékével és időtartamával arányosan. A **sejtveszteség biológiai célja** a gége kiszélesítése, hogy több levegő jusson be, hogy könnyebben meg tudjunk birkózni a félelemmel.



Ezen az agyi CT-n egy rémület-félelem konfliktus hatása látható a nagyagykéreg azon területén, amely a gége nyálkahártyát irányítja (lásd a GNM ábrát). A Hamer Góc éles gyűrű formája azt mutatja, hogy az egyén konfliktus aktív.

GYÓGYULÁSI FÁZIS: A gyógyulási fázis első részében (PCL-A) a sejtvészteséget **sejtszaporulat** állítja helyre. A hagyományos orvostudományban a sejtszaporulatot egy **gégeráknak** vagy „**torokráknak**” diagnosztizálják. A GNM ismerete szerint az új sejteket nem lehet „rákos sejteknek” tekinteni, mivel a sejtszaporulat valójában egy felépítő folyamat.


Gyógyulási tünetek a fájdalom, amit az ödéma (folyadékgyülem) miatti duzzadás okoz, **nyelési nehézségek, köhögés és rekedt hang** vagy akár teljesen elmegy a hang, mivel a hangszalagok is érintettek. A konfliktus erősségétől függően, a tünetek az enyhétől a súlyosig terjednek. Egy gyulladással ezt az állapotot **gégegyulladásnak** hívják, és jellemzően **láz** kíséri.

Az Epileptoid Krízis után a duzzadás lelohad és a PCL-B-ben a szerv működése lassan helyreáll.

MEGJEGYZÉS: Minden Epileptoid Krízist, amit a **szenzoros, poszt-senzoros vagy pre-motorikus szenzoros kéreg** irányít, azt **keringési zavar, szédülés, rövid tudatzavar** vagy teljes **tudatvesztés** (ájulás vagy „eszméletvesztés”) kíséri, a konfliktus intenzitásától függően. Egy másik jellegzetes tünet a **vércukorszint leesése**, amit az agysejtek nagymértékű glükóz használata okoz (összehasonlítva a hipoglikémiával, ami a hasnyálmirigy szigetsejtjeivel kapcsolatos).


Amit „**diftériának**” (torokgyík) hívnak, az a GNM szerint a gégében végbemenő gyógyulási folyamat a **SZINDRÓMÁVAL**. Az egyidejű vízviisszatartás megnöveli a duzzadást és felerősíti a fájdalmat; a légzés szintén nehezebbé válik.

A **hangszál polipok** megkeményedett laphám szemölcsök, amelyek a konfliktus visszaesések miatti ismétlődő gyógyulás miatt alakulnak ki. Az úgynevezett „énekes csomók” hangszalag csomók, amelyeket a hang túlzott használata (éneklés, kiabálás) miatti hangszalag sérülés okoz. Ebben az esetben a csomók az ismétlődő szövet helyreállítás következményeként alakulnak ki – egy DHS nélkül.



A GÉGE IZMOK FEJLŐDÉSE ÉS FUNKCIÓJA: A gége egy hámrétegből és sima-és harántcsíkolt izmok rétegéből áll. A gége izmok fő funkciója a hangrész tágulásának és összehúzódásának, és a gége két hangszalagból álló hang apparátusának a szabályozása. A gége izmok nyitva tartják a hangrész a légzéskor, és zártabban hangképzés közben. A gége izmok harántcsíkolt része az új mezodermból ered, a nagyagyvelőből és a motorikus kéregből történik az irányítása.

MEGJEGYZÉS: A gége simaizmai az endodermból erednek és a **középagyból** történik az irányításuk.



AGY SZINT: A gége izmoknak két irányítóközpontja van a nagyagyban. Az izmok trofikus funkcióját, amely a szövetek táplálásáért felelős, a **nagyagyvelő** irányítja; az izmok összehúzódását a **motorikus kéreg** bal oldala (a **halántéklebenyben**) irányítja. Az irányítóközpont a gége nyálkahártya agyreléje mellett, pontosan a hörgő izmokkal szemben helyezkedik el.

MEGJEGYZÉS: A **belégzés** irányítása a hörgő izmok reléjéből történik (a motorikus kéreg jobb oldalán), míg a **kilégzés** irányítása a gége izmok reléjéből történik (a motorikus kéreg bal oldalán). Normális esetben ez a két légzőmozgás egyensúlyban van. Ez megváltozik, ha egy biológiai konfliktus az egyik vagy mind a két agyrelét érinti.

BIOLÓGIAI KONFLIKTUS: A gége izmokhoz kapcsolódó biológiai konfliktus ugyanaz, mint a gége nyálkahártyáé, nevezetesen egy női **rémület-félelem konfliktus** vagy egy férfi **területi félelem konfliktus**, az ember nemétől, kezűségétől és hormon állapotától függően (lásd szintén Gégeasztma Konstelláció, Hörgőasztma Konstelláció). Ami megkülönbözteti az izomszövethez kapcsolódó konfliktustól, még az attól való aggodalom is, hogy „nem képes elszökni”, „nem képes reagálni”, „földbe gyökerezve” érzi magát (megkövül) vagy „megrekedve érzi magát” (lásd vázizmok).


Nem, Lateralitás, Hormon állapot	Biológiai konfliktus	Érintett szerv
Jobbkezes férfi (NHÁ)	Területi félelem konfliktus	Hörgő izmok
Balkezes férfi (NHÁ)	Területi félelem konfliktus	Gége izmok*
Jobbkezes férfi (ATÁ)	Rémület-félelem konfliktus	Gége izmok
Balkezes férfi (ATÁ)	Rémület-félelem konfliktus	Hörgő izmok*
Jobbkezes nő (NHÁ)	Rémület-félelem konfliktus	Gége izmok
Balkezes nő (NHÁ)	Rémület-félelem konfliktus	Hörgő izmok*
Jobbkezes nő (AÖÁ)	Területi félelem konfliktus	Hörgő izmok
Balkezes nő (AÖÁ)	Területi félelem konfliktus	Gége izmok*

NHÁ=Normál hormon állapot ATÁ=Alacsony tesztoszteron állapot AÖÁ=Alacsony ösztrogén állapot

***A balkezeseknél a konfliktus átvéődik a másik agyféltekére**

KONFLIKTUS-AKTÍV FÁZIS: a **gége izomszövetének sejtvesztesége (nekrózis)** (a nagyagyvelőből irányítva), és a konfliktus aktivitás mértékével arányosan a **gége izmok bénulásának** fokozódása (a motorikus kéregből irányítva). A bénulás **légzési nehézségeket** okoz, kifejezetten **kilégzési nehézséget – a belégzés megnyúlik** a kilégzést szabályozó gégeizmok csökkent működése miatt. Ha a hangszalagok érintettek, az **hangváltozást** (hangtörést) okoz, vagy egy intenzív konfliktus esetén egy hangszalag bénulást, ami lehetetlenné teszi a hangképzést.

MEGJEGYZÉS: A harántcsíkolt izmok azon szervek csoportjába tartoznak, amelyek a kapcsolódó konfliktusra működés veszteséggel (szintén lásd a hasnyálmirigy szigetsejtjeinek (alfa-szigetsejtek és béta-szigetsejtek), a belső fülnek (csiga és egyensúlyszerv), a szaglóidegeknek és a szemek retinájának és üvegtestének a Biológiai Speciális Programjait), vagy túlműködéssel (csonthártya és talamusz) válaszolnak



Ez az agyi CT konfliktus aktivitást mutat a gége izmok reléjén (a nagyagykéreg bal oldala – narancssárga nyilak – **lásd a GNM ábrát**), valamint a hörgő nyálkahártya agyreléjén (a nagyagykéreg jobb oldala – piros nyilak). A Hamer Gócok éles határai arra utalnak, hogy mindkét konfliktus, nevezetesen a rémület-félelem konfliktus és a területi félelem konfliktus még mindig aktív (lásd alább a gégeasztmát). Egy víz vagy folyadék konfliktus (jelenleg a PCL-A-ban), ami a jobb vese parenchymával kapcsolatos (alsó narancssárga nyilak) már megoldódott.


GYÓGYULÁSI FÁZIS: A gyógyulási fázis alatt a gége izmok felépülnek. A bénulás belenyúlik a **PCL-A**-ba. Az Epileptoid Krízis **köhögési rohamokként** jelentkezik, **gégegörcsökkel**, amelyek egy fokális rohamnak felelnek meg. Egy gégeből jövő köhögés olyan, mint az „ugatás” (a „kennel köhögés” kifejezés egy olyan rémület-félelem konfliktusra utal, amelyet az állatok szenvednek el a kennelben). A **PCL-B**-ben a gége izmok működése normalizálódik.

Amit „**görcsös diszfóniának**” neveznek, az egyaránt a gége izmok és a gége nyálkahártya gyógyulására utal. A **szamárköhögés (pertussis)** szintén egy ilyen összetett folyamat (lásd szintén a hörgő izmokhoz kapcsolódó száamárköhögést).

Visszatérő tüneteket vagy „**allergiás köhögést**” a konfliktus visszaesések okozzák, amelyeket az eredeti konfliktus során kialakult sínek váltanak ki (lásd allergiák).

MEGJEGYZÉS: Minden **szervben, amely az új mezodermából származik** („többllet csoport”), beleértve a gége izmokat, a **gyógyulási fázis végén** látható a

biológiai cél. Miután a gyógyulási folyamat befejeződött, a szerv vagy a szövet erősebb, mint korábban, ami lehetővé teszi, hogy jobban felkészültek legyünk egy hasonló jellegű konfliktusra.




A **Broca-terület** vagy **beszédközpont** a gége izmok agyreléjébe van beágyazódva (a bal agykéregfélen). A Broca központhoz kapcsolódó konkrét biológiai konfliktus egy **beszédképtelenség** vagy **nem jut szóhoz konfliktus**, amit egy akut rémületként élünk meg és „megnémulunk a félelemtől”. Ez a konfliktus-aktív fázis alatt egy **beszédzavart** okoz, egészen pontosan szóalkotási nehézségeket (hasonlítsd össze a Dadogás Konstellációval). Ez az állapot belenyúlik a **PCL-A**-ba, de az Epileptoid Krízis után normalizálódik (lásd szintén a stroke-ot és a beszédzavart).


A GÉGE ASZTMA két Biológiai Speciális Programból áll (lásd szintén a hörgő asztmát)

- konfliktus aktivitás, ami a bal halántéklebenyben lévő gége izmok agyreléjéhez kapcsolódik, amely egy rémület-félelem vagy területi félelem konfliktussal kapcsolatos, az ember nemétől, kezűségétől és hormon állapotától függően.
- konfliktus aktivitás, ami egy jobb halántéklebenyben lévő agyreléhez kapcsolódik (területi félelem konfliktus vagy rémület-félelem konfliktus, területvesztés konfliktus vagy szexuális konfliktus, területi harag konfliktus vagy identitás konfliktus, férfi területjelölés konfliktus vagy női jelölési konfliktus, az ember nemétől, kezűségétől és hormon állapotától függően).

Ebben az esetben az egyén egy **Gége Asztma Konstellációban** van az Epileptoid Krízis alatt is, amely a konfliktus-aktív fázis ideiglenes újra aktiválása.



A tényleges **asztna roham** az **Epileptoid Krízis** alatt történik. A gége izmok harántcsíktolt izmainak Epi-Krízise befelé mozgó görcsökként jelentkezik. A gége asztma **tünetei** tehát általában a **levegő kapkodása és hosszantartó belégzés** (amikor a gégeizmok érintettek, akkor a belégzés meghosszabbodik, a kilégzést szabályozó gége izmok részleges működésvesztése miatt). A sima gége izmok Epi-Krízise görcsökként jelentkezik, ami hasonló a bélkólika során történő hiperperisztaltikához. A SZINDRÓMA miatti egyidejű vízviisszatartás miatt az asztma roham súlyos lehet.



Amikor a gége és a hörgő izmok egyszerre mennek keresztül az Epileptoid Krízisen, akkor az asztma roham hosszantartó belégzéssel és a levegőért való kapkodással (gége asztma), és hosszantartó kilégzéssel és zihálással (hörgő asztma) jelentkezik. Ennek az állapotnak **status asthmaticus** a neve, amely akut légzési nehézségeket és fulladásos halált okozhat.

MEGJEGYZÉS: A kortizon egy szimpatikotóniás hatóanyag, amely újra aktiválja a konfliktus-aktív tüneteket. Ebben az esetben a gége és a hörgő izmok bénulását okozza. A gyógyszer görcsoldó hatása tehát életmentő lehet. Óvatosan kell lenni azonban a SZINDRÓMA esetén, mivel a

vízvisszatartás megnöveli a duzzadást az agyban (lásd az agyi ödémát).

A krónikus gége asztma rohamok arra utalnak, hogy a kapcsolódó rémület-félelem konfliktus még nem oldódott meg teljesen. A hagyományos orvostudományban a visszatérő asztma rohamokat általában egy „allergiával” hozzák összefüggésbe.


Tehát a gége asztma roham mind a harántcsíkolt és a sima gége izmokat érinti. A harántcsíkolt gége izmok Epileptoid Krízise gége görcsökkel és rángásokkal jelentkezik. A simaizmok Epi-Krízise hiperperisztaltikával jelentkezi, hasonlóan egy bélkólikához. Tehát MIND a sima és a harántcsíkolt gégeizmok részt vesznek az asztma krízisben. Ugyanez vonatkozik a hörgő asztma rohamra; ebben az esetben a sima és a harántcsíkolt hörgő izmok vesznek részt.

Fordítás: Váradi Hajnalka


Forrás: www.learninggnm.com

© LearningGNM.com

FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁS: Ebben a dokumentumban található információ nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást.



Nagyagykéreg	SEJTVESZTESÉG (ulceráció, nekrozis)	Szövet helyreállítása baktériumokkal
Nagyagyvelő		
Kísagy	SEJTSZAPORULAT	Sejt eltávolítás gombákkal és baktériumokkal
Agytörzs		



DHS (Dirk Hamer Szindróma) – Biológiai konfliktus


CL (Conflictolysis) – Konfliktusmegoldás

PCL (Post-Conflictolysis) – Gyógyulási fázis



© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer



HALÁNTÉKLEBÉNYEK felülnézet




NAGYAGYKÉREG oldalnézet






BIOLÓGIAI SPECIÁLIS PROGRAMOK KÉTFÁZISÚ RENDSZER



© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer




BIOLÓGIAI SPECIÁLIS PROGRAMOK KÉTFÁZISÚ RENDSZER





© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

NAGYAGYKÉREG


oldalnézet







Nagyagykérreg	SEJTVESZTESÉG (ulceráció, nekrozis)	Szövet helyreállítása baktériumokkal
Nagyagyvelő		
Kísagy	SEJTSZAPORULAT	Sejt eltávolítás gombákkal és baktériumokkal
Agytörzs		



DHS (Dirk Hamer Szindróma) – Biológiai konfliktus

CL (Conflictolysis) – Konfliktusmegoldás

PCL (Post-Conflictolysis) – Gyógyulási fázis


© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer





HALÁNTÉKLEBENYEK felülnézet



NAGYAGYVELŐ felülnézet




NAGYAGYKÉREG oldalnézet





BIOLÓGIAI SPECIÁLIS PROGRAMOK
KÉTFÁZISÚ RENDSZER

HARÁNTCSÍKOLT IZMOK




DHS (Dirk Hamer Szindróma) – Biológiai konfliktus
CL (Conflictolysis) – Konfliktusmegoldás
PCL (Post-Conflictolysis) – Gyógyulási fázis

© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer




BIOLÓGIAI SPECIÁLIS PROGRAMOK
KÉTFÁZISÚ RENDSZER

HARÁNTCSÍKOLT IZMOK




DHS (Dirk Hamer Szindróma) – Biológiai konfliktus
CL (Conflictolysis) – Konfliktusmegoldás
PCL (Post-Conflictolysis) – Gyógyulási fázis

© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer



NAGYAGYVELŐ – SZERV KAPCSOLAT




© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer



BIOLÓGIAI SPECIÁLIS PROGRAMOK
KÉTFÁZISÚ RENDSZER

HARÁNTCSÍKOLT IZMOK



DHS (Dirk Hamer Szindróma) – Biológiai konfliktus

CL (Conflictolysis) – Konfliktusmegoldás


PCL (Post-Conflictolysis) – Gyógyulási fázis

© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

A GNM kifejezéseiben egy „konstelláció” azt jelenti, hogy egy személy konfliktus-aktív két konfliktussal, amelyek az agy jobb és bal oldalát érintik.



BIOLÓGIAI SPECIÁLIS PROGRAMOK KÉTFÁZISÚ RENDSZER



DHS (Dirk Hamer Szindróma) – Biológiai konfliktus
CL (Conflictolysis) – Konfliktusmegoldás
PCL (Post-Conflictolysis) – Gyógyulási fázis

© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer